

TRANSPERİNEAL PROSTAT BİYOPSİSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Doğum Tarihi:

Tarih:

İşlemin Tanımı:

Doktorum tarafından, transperineal prostat biyopsisi yapılmasına karar verilmiştir. Bu işlem, makat ile torba (skrotum) arasındaki bölgeden (perine) özel bir iğne yardımıyla girilerek, prostat bezinden doku örnekleri alınmasını içerir. Bu işlem, prostat kanseri şüphesi olan hastalarda tanı amacıyla yapılmaktadır.

İşlemin Alternatifleri:

- Transrektal prostat biyopsisi (makattan yapılan)
- Takip (izlem)
- Gerekli görüldüğünde MR veya diğer ileri görüntüleme yöntemleri

İşlem Nasıl Uygulanır?

1. Hazırlık:

- o İşlem öncesi genellikle hafif bir lavman yapılabilir.
- o Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız işlem öncesinde kesilmiş olması gerekir.
- o Genellikle antibiyotik başlanır, enfeksiyon riskini azaltmak için.

2. Anestezi:

- o İşlem sırasında ağrı hissetmemeniz için **lokal anestezi** (bölgesel uyuşturma) yapılır.

3. İşlem Aşaması:

- o Sırt üstü bacaklar askıda (doğum) pozisyonunda yatırılırsınız.
- o Perine bölgesi temizlenir ve steril hale getirilir.

- Ultrason veya MR rehberliđi eşliđinde özel bir iđneyle perine bölgesinden girilerek prostatın çeşitli yerlerinden örnekler alınır (genellikle 12-18 örnek).
- İşlem yaklaşık **20-30 dakika** sürer.

4. Sonrasında:

- İşlemden sonra kısa bir dinlenme süresi sonrası eve gönderilirsiniz.
- İdrarda, menide ya da biyopsi bölgesinde bir miktar kan görülebilir. Bu genellikle geçicidir.
- İdrar yapamama olabilir (% 3-5). Sonda takılması gerekebilir.
- Enfeksiyon belirtileri (ateş, titreme, idrar yapamama) görülürse derhal doktora başvurmanız gerekir.

İşlem Sırasında ve Sonrasında Oluşabilecek Riskler:

- İşlem bölgesinde ağrı ve morarma
- Kanama (idrarda, menide veya biyopsi bölgesinde)
- İdrar yapmada zorlanma veya idrar retansiyonu
- Enfeksiyon (çok nadiren sepsis)
- Anesteziye bađlı reaksiyonlar
- Nadiren prostatta abse oluşumu

İşlemin Avantajları:

- Prostat kanseri varlığının kesin tanısı
- MR eşliđinde ya da hedefe yönelik alınan biyopsilerle tanı doğruluđunun artması
- Transrektal biyopsiye göre enfeksiyon riskinin daha düşük olması

Anestezi Türü:

İşlem genellikle lokal anestezi ile yapılır.

Lokal anestezi uygulamasının içerdii riskler;

1. Anestezi yeterli düzeyde etkili olmayabilir ve işlem sırasında bir miktar ağrı duyulabilir.
2. Kullanılan lokal anestetik maddeye karşı aşırı duyarlılıđı olanlarda solunum ve kalp durmasına kadar ilerleyebilen alerjik reaksiyonlar görülebilir.
3. Lokal anestezi yapılan bölgede bölgesel reaksiyonlar (kızarıklık, kaşınma,

şişlik, ısı artışı gibi) görülebilir.

Hasta Onayı:

- Yukarıda anlatılanları okuyup anladım.
- İşlemin amacı, nasıl yapılacağı, riskleri ve alternatifleri tarafıma açıkça anlatıldı.
- Sorular sordum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- Bu işlem yapılmasını kabul ediyorum / kabul etmiyorum (gereksiz olanı siliniz).

Hastanın Adı Soyadı:

İmza:

Tarih:

Doktor Beyanı:

Yukarıdaki bilgileri hastaya ve/veya yasal temsilcisine anlaşılır bir şekilde anlattım. İşlem hakkında bilgilendirildiğini ve onay verdiğini beyan ederim.

Doktorun Adı Soyadı:

İmza:

Tarih: